

## KULLANMA TALİMATI

### **GLOGER % 0.15 Göz Damlası, Çözelti**

Göze damlatılır

Steril

- **Etkin madde:** Bir ml çözelti, 1.5 mg (%0.15) brimonidin tartarat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Polivinil alkol 8-88, sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit monohidrat, sodyum klorür, benzalkonyum klorür, disodyum edetat, hidroklorik asit (pH ayarlayıcı), sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı), enjeksiyonluk su içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. GLOGER nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. GLOGER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. GLOGER nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. GLOGER'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. GLOGER nedir ve ne için kullanılır?**

GLOGER, plastik bir şişe içinde 5 ml çözelti olarak kullanıma sunulmuş bir göz damlasıdır.

GLOGER, bir antiglokem preparatıdır. Etkin maddesi brimonidindir ve alfa adrenerjik reseptör antagonisti denilen bir ilaç grubuna dahildir.

GLOGER, göz içindeki yüksek basıncı düşürmek için kullanılır. Bu yüksek basınç, glokom denilen hastalığa neden olabilir. Yüksek basınç düşürülmezse, görmenizde hasar oluşturabilir.

### **2. GLOGER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**GLOGER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Brimonidin tartarata ya da GLOGER'in diğer bileşenlerine alerjiniz varsa,
- Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü adlı ilaç grubu ile tedavi ediliyorsanız,
- GLOGER, 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

## **GLOGER'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eęer,

- Gemiřte bbrek ya da karacięer problemleri yařadınızsa,
- Depresyonunuz varsa ya da depresyon geirdiyseniz, zihinsel kapasiteniz azalmıř ise, beyne kan akımı azalmıř ise, kalp problemleriniz varsa ya da geirdiyseniz, kol ve bacaklara kan akımında bozukluk yařadıysanız veya yařıyorsanız veya kan basıncı problemi yařadıysanız ya da yařıyorsanız,

Bazen GLOGER ile gzde alerji (gzde řiřkinlik, kařıntı, kızarıklık) grlebilir, alerji gzlenirse GLOGER tedavisini kesiniz.

Doktorunuz kullanılmasını tavsiye etmedięi srece GLOGER 2 yařın altındaki ocuklarda kullanılmamalıdır.

2-7 yař ve/veya 20 kg altındaki ocuklar, ciddi somnolans (gndz vakti ařırı uyuklama hal) nedeniyle dikkatle takip edilmelidir.

*Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.*

### **GLOGER'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

GLOGER'in herhangi bir yiyecek/iecek ile etkileřime girdięi bilinmemektedir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Doktorunuza hamile olduęunuz ya da hamile kalmayı planladıęınızı syleyiniz. Bu tıbbi rn gerekli ise hamilelerde doktor kontrol altında kullanılabilir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

GLOGER emzirme dneminde kullanılmamalıdır.

### **Ara ve makine kullanımı**

GLOGER, yorgunluk ve/veya halsizlięe, bulanık grmeye neden olabilir. Ara ya da makine kullanmaya bařlamadan nce grmenizin tekrar netleřmesini ve yorgunluk, halsizlik var ise, bunların gemesini bekleyiniz.

### **GLOGER'in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

GLOGER'de yardımcı madde olarak benzalkonyum klorr bulunur. Bu madde gz irritasyonuna neden olabilir. Yumuřak kontak lenslerle temasından kaınınız. Uygulamadan nce kontak lensi ıkartınız ve lensi takmak iin en az 15 dakika bekleyiniz. Yumuřak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduęu bilinmektedir

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Reçetesiz ilaç ve gıda takviyesi dahil başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bilgi veriniz. Özellikle aşağıdakilerden birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

- Sedatifler (yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç), opiatlar (uyuşturucu ilaç), barbitüratlar veya düzenli olarak alkol tüketiyorsanız,
- Anestezikler,
- Beta blokerler gibi kalp rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar veya tansiyon düşürücü ilaçlar,
- Klorpromazin, metilfenidat ve reserpin gibi metabolizmayı etkileyebilen ilaçlar,
- Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya diğer antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlar)
- Göz durumunuzla ilgili olmasa bile her türlü duruma karşı ilaçlar

GLOGER'i başka bir göz ilacıyla birlikte kullanıyorsanız, GLOGER ve diğer ilaç arasında en az 5 dakika ara olmalıdır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. GLOGER nasıl kullanılır?**


#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

GLOGER'i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

İlacınızın etkisi ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz. Önerilen GLOGER dozu, etkilenen göze yaklaşık 8 saat arayla olmak üzere günde 3 kez 1 damladır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Şişenin kapağındaki kurcalamaya karşı güvenlik bandı bozulmuş ise ürünü kullanmayınız.



- Ellerinizi yıkayın. Başınızı arkaya doğru eğin ve tavana bakın.
- Alt göz kapağınızı cep oluşturana kadar yavaşça aşağı doğru çekin.
- Şişeyi ters çevirin ve tedavi gereken göze bir damla düşene kadar şişeyi sıkın.
- Alt göz kapağınızı bırakın ve gözünüzü 30 saniye boyunca kapayın.

Damlayı gözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyiniz.

İltihaplanmaların önlenmesine yardımcı olmak için, şişenin ucunun gözünüze ya da herhangi bir başka yüzeye temas etmesine izin vermeyin. Şişeyi kullandıktan hemen sonra kapağını kapatınız.

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlara uyunuz.

İlacınızı kullanmayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.  
İlk açmadan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

### **Değişik yaş grupları**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

GLOGER, 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda dozaj ayarlaması gerekmez.

### **Özel kullanım durumları**

#### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlarda incelenmemiş olduğundan, bu rahatsızlıklar sizde var ise, GLOGER'i dikkatli kullanınız.

*Eğer GLOGER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla GLOGER kullandıysanız:**

*GLOGER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **GLOGER kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **GLOGER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

GLOGER'in etkisini gösterebilmesi için her gün kullanılması gereklidir. Bu nedenle ilacınızın kullanımına doktorunuza danışmadan ara vermeyiniz.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, GLOGER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

#### **Aşağıdakilerden biri olursa GLOGER'i kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurun:**

İlaç alerjisine bağlı olarak eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GLOGER'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

## **Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

### **Çok yaygın yan etkiler**

Bunlar GLOGER kullanan 10 hastada 1'den fazla kişiyi etkileyebilir:

- Gözde alerji
- Kırmızı göz
- Gözde kaşıntı

### **Yaygın yan etkiler**

Bunlar GLOGER kullanan 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyebilir:

- Bronşit
- Nezle belirtileri
- Boğaz iltihabı
- Kaşınan, akan ya da tıkalı burun
- Sinüs enfeksiyonu
- Sinüs iltihabı
- Soğuk algınlığı ve göğüs enfeksiyonları
- Kanda yüksek kolesterol değerleri
- Alerjik tepki
- Baş dönmesi
- Baş ağrısı
- Göz kapağında kaşıntı
- Gözde yanma ve batma
- Göz kapağının iç tarafında küçük şişlikler
- Gözün şişmesi
- Göz yüzeyinde kanama
- Göz yüzeyinde iltihap
- Sulu göz
- Yapışkan göz
- Kuru göz
- Gözde tahriş
- Göz ağrısı
- Göz yüzeyinde küçük şişlikler
- Gözde yabancı cisim hissi
- Işık hassasiyeti
- Görme bozuklukları
- Görüş alanında anomaliler
- Uçan cisim görme
- Görüşün kötüleşmesi
- Göz kapağı ve göz yüzeyi iritasyonları
- Bulanık görme
- Gözün içinde bulanık lens
- Gözün ön bölümünün merkezinin iltihabı
- Göz kapağı anomalileri
- Gözün yaşarması
- Gözdeki jel dokunun ayrılması
- Gözde anormal jel doku
- Göz alerjisi

- Yüksek tansiyon
- Düşük tansiyon
- Öksürük
- Nefes darlığı
- Hazımsızlık
- Ağız kuruluğu
- Hazım bozuklukları
- Göz kapağının şişmesi
- Göz kapağı kızarıklığı
- Döküntü
- Halsizlik
- Yorgunluk

### **Yaygın olmayan yan etkiler**

Bunlar GLOGER kullanan 1000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyebilen:

- Uyumada güçlük
- Uykulu hissetme
- Tat duyusunda bozukluk veya anormallik
- Gözün ön bölümünde yüzeysel hasar
- Arpacık
- Burunda kuruluk

Bu yan etkiler GLOGER'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

### **5. GLOGER'in saklanması**

*GLOGER'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki sıcaklığında saklayınız.

Açıldıktan sonra çözeltilere mikrop bulaşabilir. Bu da göz enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu nedenle şişe, içinde çözelti olmasına rağmen açıldıktan 28 gün sonra atılmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLOGER'i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat Sahibi :** Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Anıttepe Mah. Turgut Reis Cad. No: 21  
Tandoğan / Çankaya – Ankara

**Üretim Yeri :** Mefar İlaç Sanayii A.Ş.  
Kurtköy-Pendik/İstanbul

*Bu kullanma talimatı 24/12/2018 tarihinde onaylanmıştır.*